

به جای انسولین، خطر ابتلا به سرطان GLP-1 استفاده از داروهای در بیماران مبتلا به دیابت را کاهش می‌دهد

پگاه حبیبی by ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ Posted on



Category: [بین الملل](#)



از جمله اوزمپیک GLP-1 بر اساس نتایج پژوهشی که روز گذشته منتشر شد، بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که از درمان‌های استفاده می‌کنند، با خطر کمتری برای ابتلا به ۱۰ نوع سرطان مرتبط با اضافه وزن نسبت به افرادی که انسولین و سایر داروهای دیابت را مصرف می‌کنند، دارند.

برای دیابت نوع ۲ در بازار عرضه شده‌اند. آخرین نسل این درمان‌ها (داروی GLP-1 حدود دو دهه است که درمان‌های در کنترل سطح قند خون و کاهش وزن (Eli Lilly و داروی مونجارو محصول شرکت Novo Nordisk اوزمپیک، محصول بسیار مؤثر واقع شده‌اند. اولین نمونه از نسل جدید این داروها، اوزمپیک بود که در سال ۲۰۱۷ تأیید شد.

منتشر شد، پژوهشگران با بررسی سوابق پزشکی JAMA Network Open در پژوهشی که نتایج آن روز گذشته در مجله پزشکی به جای انسولین، در کاهش خطر ابتلا به ۱۳ نوع سرطان GLP-1 ۱/۶ میلیون بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ دریافتند که مصرف مرتبط با اضافه وزن از جمله سرطان کیسه صفرا و سرطان کلیه موثر است.

