

Posted on ۱۴. .۱. ۴/۱۳ by ravabet



Tags: [بیوتکنولوجی](#), [کرونا](#)



به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از ایرنا، بر اساس آمار رسمی کشورها، تاکنون حدود ۱۷۵ میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی به این ویروس مبتلا شده و بیش از سه میلیون و ۷۷۷ هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: از مصرف هرگونه دارو با هدف پیشگیری از عوارض **واکسن کرونا** همچون تب و لرز و سردرد (قبل از تزریق) پرهیز شود.

مسعود مردانی در خصوص ملاحظات دارویی واکسن کرونا عنوان کرد: برخی افراد قبل از تزریق واکسن کرونا به منظور پیشگیری از عارضه‌های این واکسن دارو مصرف می‌کنند، به عنوان مثال، برای پیشگیری از تب، استامینوفن مصرف می‌کنند، این اقدام از طرف جامعه پزشکی توصیه نمی‌شود و برای پیشگیری از **عوارض** نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

مردانی یادآور شد: پس از تزریق واکسن کرونا در صورت بروز برخی علائم همچون بدن درد، تب و لرز و... می‌توان بدون ترس از ایجاد عارضه از استامینوفن و مسکن (ایبuprofen) استفاده کرد، اما قبل از تزریق نباید دارو مصرف شود.

بهبودیافتگان کرونا ۶ هفته پس از بهبود بیماری واکسن کرونا را تزریق کنند

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین در خصوص بهبودیافتگان کرونا خاطرنشان کرد: بهبودیافتگان کووید-۱۹، ۶ هفته پس از بهبود بیماری، واکسن کرونا را تزریق کنند.

به گزارش ایرنا، تاکنون در کشور ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۰۴ نفر دُز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۴۸۱ هزار و ۱۰ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند. بر این اساس، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۹۱۴ دوز رسید و ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند ۹۸ (فوریه ۲۰۲۰) بروز پاندمی (همه‌گیری جهانی) این بیماری را تأیید کرد.

بر اساس آمار رسمی کشورها، تاکنون حدود ۱۷۵ میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی به این ویروس مبتلا شده و بیش از سه میلیون و ۷۷۷ هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

از ابتدای شیوع کرونا در کشور (اسفند ۹۸) تا کنون ۸۴ هزار و ۶۲۷ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده‌اند.

