

افزایش خطر حمله قلبی و سکته با مصرف ایبوپروفن

Posted on ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ by ravabet



Categories: [داروهای شیمیایی](#), [منتخب](#)

Tag: [داروهای شیمیایی](#)



به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از سلامت نیوز، شواهد قابل توجهی وجود دارد که افزایش خطر حوادث قلبی عروقی با ها را تأیید می کند NSAID بسیاری از

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ، ایبوپروفن یک مُسکن روزمره برای انواع دردها از جمله کمر درد و دندان درد است. این تعلق دارد (NSAID) دارو به گروهی از داروها به نام داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی

به گزارش دلی اکسپرس، محققان کلینیک مایو آمریکا هشدار می دهند اگرچه مصرف ایبوپروفن در دوزهای کوچک بی خطر است، اما مصرف با دوز بالا می تواند خطر حمله قلبی، سکته مغزی و فشار خون را افزایش دهد

ها به دو دلیل عمده برای سیستم قلبی عروقی پرخطر هستند. NSAID اول اینکه، آنها سطح مواد را در خون تغییر می دهند که احتمال ایجاد لخته های خونی را افزایش می دهد. لخته خون می تواند شریان تنگ شده در قلب را مسدود کرده و باعث حمله قلبی شود

ها جریان خون را در کلیه ها تغییر داده و باعث می شوند بدن نمک و آب بیشتری در خود نگه دارد. این مسئله NSAID دوم اینکه باعث افزایش فشار خون می شود که خطر سکته مغزی را افزایش می دهد

به گفته محققان، مصرف ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم ایبوپروفن سه تا چهار بار در روز بی خطر است. در طول ۲۴ ساعت نباید بیش از ۱۲۰۰ میلی گرم مصرف شود

مانند ایبوپروفن یا آسپرین همراه غذا یا بعد از غذا یا شیر مصرف (NSAID) بهتر است داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی شوند.

