

# تاثیر جانبی این دارو خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد

Posted on ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ by ravabet



Categories: [بررسی داروهای شیمیایی](#), [منتخب](#)



به گزارش مجله خبری غذا و دارو به نقل از ایسنا، بر اساس مطالعه جدیدی که نتایج مصرف استاتین را برای یک دوره چهار ساله پیگیری کرده است، تجویز داروهای استاتین برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می‌تواند خطر ابتلای آنان را به سرطان و مرگ ناشی از سرطان کاهش دهد.

منتشر شد، نشان می‌دهد در مقایسه با کسانی که استاتین (European Heart Journal) این مطالعه که در مجله قلب اروپا مصرف نکرده‌اند، کسانی که از این داروها استفاده می‌کنند، ۱۶ درصد کمتر احتمال ابتلا به سرطان دارند. همچنین احتمال مرگ بر اثر سرطان نیز در کسانی که استاتین مصرف می‌کنند، ۲۶ درصد کمتر است.

تحقیقات قبلی نشان داده است تعداد زیادی از بیماران مبتلا به نارسایی قلب، به سرطان مبتلا می‌شوند.

متخصصان این پدیده را ناشی از عوامل مشترک بین سرطان و نارسایی قلبی می‌دانند که سازمان ملی بهداشت انگلیس آن را ناتوانی قلب در پمپاژ کافی خون در بدن تعریف می‌کند.

این عوامل مشترک، شامل التهاب و برخی زمینه‌های ژنتیکی است.

با این حال، این مطالعه مبتنی بر مشاهده وضعیت بیماران قلبی که بیش از ۸۷ هزار نفر را در هنگ کنگ بررسی کرده است، بزرگ‌ترین تحقیق از این نوع برای بررسی ارتباط مستقیم بین استفاده از استاتین و خطرات مرتبط با پیشرفت سرطان و مرگ ناشی از سرطان در میان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است.

ردوکتاز هستند که برای کاهش چربی خون تجویز می‌شود و به کنترل HMG-CoA به گزارش ایندپندنت، استاتین‌ها داروی مهار بیماری قلبی و کاهش مرگ و میر افراد مبتلا به بیماری‌های قلب و عروق کمک می‌کند. از این دسته از داروها معمولا برای کاهش کلسترول نیز در درمان بیماران مبتلا به کلسترول بالا استفاده می‌شود.

