

خطر مسمومیت با ضد عفونی کننده ها

written by پگاه حبیبی | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰



به گزارش پایگاه خبری غذا و دارو و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزش‌های مردمی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تأکید بر بهداشت دستها و نقش مهم استفاده از فرآورده‌ها بر پایه الكل اتیلیک (اتانول) به منظور پیشگیری از این عفونت، از مردم خواست در استفاده از این فرآورده‌ها مراقب مسمومیت باشند.

و ریا رحیمی افزوود: براساس مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از برخی بیمارستان‌های کشور در ابتدای امسال مواردی از مسمومیت در اثر مصرف خوراکی محلول‌های حاوی الكل اتیلیک (اتانول) و حتی مرگ بر اثر مصرف خوراکی الكل متیلیک (متانول) در برخی از بیماران گزارش شده است.

او تأکید کرد: مصرف خوراکی الكل اتیلیک (اتانول) و یا غرغره کردن اتانول در محوطه دهانی هیچ‌گونه اثری در پیشگیری از عفونت کرونا ندارد و با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه است.

او اظهار داشت: الكل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد میکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با الكل اتیلیک (اتانول) است، به علت سمیت بالا، مصرف خوراکی آن با بروز مسمومیت‌های شدید، کوری و مرگ همراه است میزان جذب پوستی متانول به ویژه در پوستهای آسیب دیده بالا بوده و میتواند سبب بروز مسمومیت شود.

او هشدار داد: الكلهای دستساز و مشروبات الكلی یکی دیگر از ترکیباتی است که سوء مصرف آنها میتواند منجر به مسمومیت و مرگ شود.

او گفت: متاسفانه در اواخر سال ۱۳۹۸ و ابتدای امسال همزمان با شیوع بیماری کرونا و تبلیغات عده‌ای سودجو، گروهی از مردم اغفال شدند و با تصور اینکه مصرف خوراکی الكل سبب پیشگیری از ابتلا به کرونا میشود، دچار مسمومیت شدند.

او بیان کرد: علاوه بر این موارد، دسترسی آسان به الكل باعث شد افراد ناآگاه با مصرف خوراکی الكل و مشروبات الكلی قاجاق و دستساز حاوی متانول، دچار مسمومیت شوند و مرگ و میر بالای ناشی از متانول به همین علت بوده است. براساس آمار به دست آمده از بیمارستان‌های کشور، در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد در در نیمه نخست امسال، بیش از هفت هزار و ۵۸۳ مورد مراجعه به بیمارستان در اثر مسمومیت با الكل داشته‌ایم.

بیشترین مسمومیتها بر اثر سوء مصرف مواد مخدر

رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزش‌های مردمی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه در سال‌های اخیر همه ساله بین ۶ تا هفت هزار نفر از هموطنانمان در اثر بروز انواع مسمومیت جان باخته‌اند. گفت: بیشترین مسمومیتی که در سال‌های اخیر منجر به فوت شده، مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرك

به میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد از کل موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌ها است.

رحیمی افزود: مرگ ناشی از سوء مصرف مواد ممکن است در اثر مصرف میزان بالای مواد مخدر، محرك و الكل، مصرف به قصد خودکشی و یا مصرف اتفاقی خصوصا در کودکان باشد.

او گفت: همچنین مرگ ناشی از سو مصرف مواد میتواند در افراد که از طریق بلعیدن مقادیر بالای مواد مخدر بسته‌بندی شده در مبدأ و دفع آن در مقصد اقدام به قاچاق و توزیع مواد مخدر می‌نمایند و بسته‌های مواد مخدر در لوله گوارشی آن‌ها باز می‌شود، رخ دهد.

او اضافه کرد: به طور کلی مسمومیت ناشی از مواد مخدر مختلف منجمله تریاک، هروئین، متادون، ترامadol بسیار خطرناک است و فرد مسموم هرچه سریع‌تر باید به مراکز درمانی منتقل شود.

او گفت: بسیاری از این موارد ممکن است در کودکانی رخ دهد که به صورت اتفاقی محتویات بطری حاوی داروی ترک اعتیاد، شربت متادون را خورده‌اند. توصیه اکید می‌شود که شربت متادون به بطری نوشیدنی‌های خوراکی مانند نوشابه منتقل نشود و به هیچ عنوان در یخچال و در دسترس دیگر اعضای خانواده قرار نگیرد.

رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزش‌های مردمی معاونت غذا و دارو عنوان کرد: از سال ۱۳۹۷ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۹، مسمومیت با مواد مخدر با شیوه ۱۷ تا ۲۱ درصدی، جزء یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه به بخش مسمومین در بیمارستان‌های کشور است.

به گفته او، از این میان مسمومیت با متادون و ترامadol در صدر عوامل مسمومیت‌زای مخدر قرار دارند. در رتبه بعدی می‌توان به مسمومیت ناشی از تریاک و شیشه نیز اشاره کرد.