ریتوناویر و لوپیناویر برای درمان افراد مبتلا به HIV داروهای تومورهای مغزی نوروفیبروماتوز نوع ۲ آزمایش شدند

Posted on ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ by پگاه حبیبی

Category: بین‌الملل

که گونه‌ای از بیماری‌های ژنتیکی است که در آن تومورها در امتداد اعصاب رشد (NF2) در نیمی از موارد نوروفیبروماتوز نوع 2 می کنند، ژن معیوب از مادر به فرزند منتقل می شود، اما در دیگر موارد، این طور به نظر می‌رسد که ژن معیوب، خود به خود رشد می‌کند.

استفاده می‌شدند قرار است در افرادی که دارای تومورهای مغزی متعدد غیرقابل HIV این داروها که پیش از این برای درمان درمان هستند، آزمایش شوند. پژوهشگران بر این باور هستند که داروهای ریتوناویر و لوپیناویر می‌توانند اندازه تومورها را در کوچک کنند (NF2) بیماران مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 2.

را کوچک کرده و سرعت انتشارشان را کاهش NF2 می‌توانند تومورهای HIV نتایج این پژوهش بالینی نشان می‌دهند داروهای دهند. پیش از این، دیگر پژوهش‌ها نشان داده بود که این داروها می‌توانند به درمان انواع دیگر تومور مغزی نیز کمک کنند.