

# یک پژوهش نگران‌کننده؛ احتمال ارتباط اوزمپیک با عارضه‌ای که منجر به نابینایی می‌شود

written by یگانه حبیبی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰



بر اساس آخرین پژوهش‌ها، افرادی که داروی سماگلوتید برای آنها تجویز شده بود، بیشتر در معرض ابتلا به نوعی عارضه در عصب بینایی بودند که می‌تواند منجر به از دست دادن ناگهانی بینایی شود.

پژوهشی که در نشریه JAMA Ophthalmology منتشر شد، نشان می‌دهد افرادی که Ozempic و Wegovy مصرف می‌کنند ممکن است در معرض افزایش خطر ابتلا به یک بیماری ناتوان‌کننده چشم به نام "نوروپاتی ایسکمیک بینایی" قرار گیرد، اختلالی که می‌تواند باعث کاهش غیرقابل برگشت بینایی شود.

با این وجود، محققان در این پژوهش تاکید کردند که مطالعات بیشتری برای تایید ارتباط بین این داروهای پرفروش و مشکلات بینایی مورد نیاز است.

این عارضه، دومین بیماری شایع عصب بینایی در ایالات متحده است که طبق آمار آکادمی چشم‌پزشکی ایالات متحده آمریکا، از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر، ۱۰ نفر به این عارضه مبتلا می‌شوند و عارضه‌ای دائمی بوده که در حال حاضر درمان ندارد.